

Утвержден
Государственным агропромышленным
комитетом СССР
25 февраля 1988 года

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
ЖИВОТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
КРОЛИКИ КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ
ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ БОНИТИРОВКЕ (ОЦЕНКЕ)
ОСТ 10 114-88

Дата введения
с 1 августа 1988 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Утвержден Государственным агропромышленным комитетом СССР 25 февраля 1988 г.

Внесен Подотделом племенного дела селекционных центров и племенных хозяйств
Госагропрома СССР.

Зарегистрирован от 29 марта 1988 г.

Введен впервые.

Настоящий стандарт устанавливает зоотехнические требования при бонитировке кроликов
клеточного разведения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бонитировка кроликов - индивидуальная оценка их племенных и продуктивных качеств.

Кроликов оценивают по их породности, живой массе и телосложению, окраске и качеству
волосяного покрова. Животных, оставляемых на племя, дополнительно оценивают по
воспроизводительной способности и происхождению.

1.2. Ежегодно в ноябре-декабре бонитировке подлежат: на племенных фермах животные
основного стада, проверяемые крольчихи и ремонтный молодняк; на товарных фермах - самцы и
самки племенного ядра и ремонтный молодняк.

Молодняк, реализуемый на племя в другие хозяйства, бонитируют при реализации, начиная
с 2-месячного возраста и старше.

1.3. Организацию и проведение бонитировки в хозяйстве возлагают на главного (старшего)
зоотехника. Ее могут проводить зоотехники-селекционеры, управляющие фермами, начальники
цехов, бригады.

1.4. Бонитировку кроликов проводят при хорошей освещенности рассеянным солнечным

светом или лампами дневного света.

1.5. При подготовке к бонитировке необходимо: привести в порядок все записи в журналах и племенных карточках за истекший производственный год; сверить по ним ушные номера кроликов, плохо заметные - возобновить; подвергнуть ветеринарному осмотру всех кроликов и выбраковать из стада по результатам осмотра больных и старых; проверить упитанность животных и довести их к осенней бонитировке до заводской упитанности.

На племенной ферме и в племенном ядре товарной фермы молодняк кроликов татуируют (клеймят) в возрасте 1 - 2 месяцев до отсадки от матерей. На правое ухо наносят порядковый номер, начинающийся на каждой ферме ежегодно с единицы; на левое ухо номер, в котором первая цифра соответствует месяцу, вторая - последней цифре года рождения крольчонка, а третья - номеру отделения или бригады.

1.6. Ремонтный молодняк в возрасте трех месяцев бонитируют по породности, живой массе, телосложению. По этим же показателям бонитируют при продаже на племя молодняк в возрасте двух месяцев и старше.

Кроликов основного стада и ремонтный молодняк, вводимый в основное стадо, включая разовых проверяемых самок, в ноябре - декабре бонитируют по породности, живой массе, телосложению, густоте меха и ее уравниваемости и окраске волосяного покрова.

2. ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Оценка породности

К чистопородным относят кроликов, происходящих от животных одной и той же породы (типа), разведение которых в себе в течение трех предыдущих поколений подтверждено зоотехническими документами, а также типичных для породы помесей кроликов, начиная с IV поколения поглотительного скрещивания.

2.2. Оценка признаков, определяющих класс кролика

Все признаки: живую массу, телосложение, густоту волосяного покрова и ее уравниваемость, окраску волосяного покрова оценивают как "элита", первый (I), второй (II) и третий (III) класс.

2.2.1. Оценка живой массы

Живую массу определяют путем индивидуального взвешивания взрослых животных с точностью до 0,1 кг, молодняка - 0,01 кг.

По результатам взвешивания животных относят к определенному классу в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИВОЙ МАССЕ КРОЛИКОВ, КГ

Воз- раст, мес.	Породы				
	Мясо-шкурковые			Мясные	Пуховые
	Белый великан	Советская шиншилла, черно-	Венский голубой, серебристый,	Белая новозеландская, калифорнийская	Белая пуховая

				бурый, серый великан			советский мардер, бабочка и др. породы								
	Класс														
	Э	I	II	Э	I	II	Э	I	II	Э	I	II	Э	I	II
2	1,8	1,7	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,8	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3
3	2,6	2,4	2,2	2,5	2,3	2,1	2,2	2,0	1,8	2,6	2,3	2,1	2,1	1,9	1,7
4	3,3	3,0	2,7	3,2	2,9	2,6	2,9	2,6	2,3	3,2	2,8	2,5	2,7	2,4	2,1
5	3,9	3,5	3,1	3,8	3,4	3,0	3,5	3,1	2,7	3,7	3,2	2,8	3,2	2,8	2,4
6	4,5	4,0	3,5	4,3	3,8	3,3	4,0	3,5	3,0	4,0	3,5	3,1	3,7	3,2	2,7
7	5,0	4,3	3,8	4,8	4,2	3,7	4,4	3,9	3,4	от 4,0 до 5,0	от 3,5 до 3,9	от 3,0 до 3,4	4,1	3,5	3,0
8	5,3	4,6	4,1	5,1	4,4	3,9	4,7	4,2	3,7				4,4	3,7	3,2
9 и старше	5,5	4,8	4,4	5,3	4,6	4,2	4,9	4,4	3,9				4,6	3,9	3,4

2.2.2. Оценка телосложения

Телосложение кроликов оценивают визуально по степени развития костяка, ширине и глубине груди, форме и величине головы, внешнему виду спины, поясницы, крестца, крупа, крепости и постановке конечностей.

Оценку телосложения кроликов проводят в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

ОЦЕНКА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ КРОЛИКОВ

Тип, порода	Класс			
	Элита	I	II	III
Мясо- шкур- ковые	Кролики должны иметь крепкое телосложение, хорошо развитый костяк, типичное для данной породы туловище, шею и голову, несколько удлиненную у самок и более округлую массивную у самцов с прямостоячими ушами; грудь хорошо развита, широкая и глубокая; спина широкая и прямая; пояснично-крестцовая часть удлиненная; круп округлый; конечности крепкие, правильно поставленные	То же, что элита, но недостаточно развитая грудь	Слаборазвитая грудь, провислая спина, шилозадость	Не удовлетворяет требованиям высших классов
Мясные	То же, что и для мясо-шкурковых пород. Отличительные особенности: компактное телосложение, хорошо развитые мясные формы, округлый круп, широкая грудь и поясница	То же, что и элита, но недостаточно выражен мясной тип (слабая округлость крупа и малая его ширина)	Слаборазвитый костяк, обрубленный или свислый круп. Мясной тип слабо выражен (узкая поясница)	То же
Пухо- вые	То же, что и для мясо-шкурковых пород. Крепкая конституция с	То же, что и элита, но	Слаборазвитый, очень	То же

	хорошо развитым костяком и правильными формами телосложения	костяк тоньше	тонкий костяк	
--	---	---------------	---------------	--

2.2.3. Оценка густоты волосяного покрова и ее уравнинности

Густоту волосяного покрова у кроликов определяют визуально на середине хребта по величине площади дна "розетки", образующейся при раздувании волос, а уравнинность густоты - сопоставлением площади дна "розетки" на крупе, хребте и боках.

Оценку качества волосяного покрова проводят в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

ОЦЕНКА ГУСТОТЫ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И ЕЕ УРАВНЕННОСТИ

Тип, порода	Класс			
	Элита	I	II	III
Мясо-шкурковые <*>	Равномерно распространенный по всему туловищу очень густой волосяной покров с упругой эластичной остью, очень густая подпушь. При раздувании волосяного покрова на дне "розетки" кожа не обнаруживается	Равномерно распределенный по всему туловищу густой волосяной покров с упругой эластичной остью, густая подпушь. При раздувании волосяного покрова на дне "розетки" обнаруживается поверхность до 1 кв. мм	Неуровненная густота опушения: более густая подпушь на огузке и менее густая на хребте и боках. При раздувании волосяного покрова на дне "розетки" обнаруживается поверхность кожи от 1 до 2 кв. мм	Не удовлетворяет требованиям более высоких классов

<*> Мясные и пуховые породы по этому признаку не оценивают.

2.2.4. Оценка окраски

Окраску волосяного покрова оценивают по выраженности типичного для данной породы цвета направляющих, остевых и пуховых волос и чистоте окраски, то есть по отсутствию нежелательных оттенков (табл. 4).

Таблица 4

ОЦЕНКА ОКРАСКИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА КРОЛИКОВ РАЗНЫХ ПОРОД

Порода	Класс			
	Элита	I	II	III
Мясо-шкурковые				
Серый великан	По окраске волосяного покрова кролики этой породы делятся на две основные цветные	Нижняя зона цветной	Расплывчатая	Все, не относящиеся

	группы: серо-заячья (рыжевато-серая) и темно-серая. Серо-заячья окраска обусловлена сочетанием зонально окрашенных остевых и пуховых волос. При раздувании волосяного покрова в образующейся "розетке" ярко выражено пять цветовых зон: у основания голубая, затем желтоватая, выше - темно-рыжая. Затем светлая с желтоватым оттенком и самая верхняя - черная. На брюшке и нижней части хвоста ость белая, подпушь голубая. Верхняя часть хвоста и ободок на ушах очень темные, почти черного цвета; темно-серая окраска волосяного покрова, темнее серо-заячьей, с буроватым оттенком. Подпушь темно-голубого цвета. Волосяной покров на брюшке несколько светлее, чем на остальной части тела	"розетки" темно-серого цвета. Недостаточно четко выражена зональность в окраске волосяного покрова	"розетка"	к первым двум классам
Белый великан	Волосяной покров чисто-белый, блестящий, однотонный	Незначительное ослабление блеска	Слабый блеск	Матовый оттенок
Черно-бурый	Волосяной покров черно-бурый, однотонно-черный на шее, спине, огулке. На боках хорошо выраженная зональность: у основания голубая, затем темная, выше - светлая зона и последняя - черная, образующая вуаль	Буроватость вуали или наличие зональности на шее, спине и огулке	Очень темный или очень светлый тон окраски	Пучки белых волос на отдельных участках тела. Тусклая окраска
Бабочка	Основной тон белый; на спине (в виде ремня или змейки), боках расположены черные или коричневые пятна разного размера и конфигурации; на носу и щеках они напоминают крылья бабочки. Обязательное наличие симметрии пятен	Незначительно ослаблен тон окраски пятен	Незначительное нарушение симметрии пятен	Полное отсутствие симметрии пятен
Серебристый	Общая окраска серебристая. Кроющие волосы чисто-белые и черные, а пуховые голубые в верхней части и несколько светлее у основания	Очень светлая или очень темная окраска. Пуховые волосы серого цвета	Тусклая окраска по всему туловищу	Тусклая неравномерная окраска или ржавый налет
Шиншилла	Основной тон серебристо-серо-голубой; на брюшке, шее, нижней части хвоста, внутренней стороне ног почти белый. При раздувании волосяного покрова на спине и боках ярко выражены различно окрашенные зоны: у основания чисто-голубая, затем осветленная, темная, белая и самая верхняя - чисто-черная. Пух на брюшке голубой	Нижняя зона "розетки" серого цвета	Недостаточно ярко выражена зональность в окраске	Очень светлый или чрезмерно темный тон, расплывается "розетка". Отсутствует светло-серый клин на затылке. Пух на брюшке белый
Венский голубой	Общий тон серо-голубой, однотонный по всему телу, без седины	Наличие единичных белых волос	Наличие белых волос по всему туловищу	Коричневый оттенок в общем тоне окраски
Советский мардер	Туловище однотонно коричневое. Передняя часть головы, уши, хвост и лапы темнее туловища	Наличие отдельных белых волос	Незначительная неравномерность окраски	Все, не относящиеся к первым двум классам
Мясные				
Калифорнийская	Волосяной покров белый, блестящий; уши, нос, кончики лап и хвоста черные или почти черные	Незначительное ослабление блеска	Осветление окраски на ушах, носу, лапах, хвосте	То же
Новозеландская белая	Волосяной покров белый, блестящий	То же	Тусклая окраска	То же
Пуховые				
Белая пуховая	Волосяной покров белый, блестящий	То же	То же	То же

У кроликов, имеющих зональную окраску остевых волос, о степени ее выраженности судят по характеру "розетки" на огузке, спине и боках, учитывая количество и контрастность колец (зон).

Окраску волосяного покрова кроликов оценивают в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

2.2.5. Оценка пуховой продуктивности

Продуктивность кроликов основного стада пуховых пород определяют по сбору пуха за год, а продуктивность молодняка - по двум первым сборам в 2 и 4-месячном возрасте (табл. 5).

Таблица 5

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРОЛИКОВ ПО ПУХОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

Класс	Половозрелые кролики		Молодняк	Класс	Половозрелые кролики		Молодняк
	самки	самцы			самки	самцы	
Э	500	450	60	II	400	350	40
I	450	400	50	III	300	300	30

Оценку кроликов пуховых пород по пуховой продуктивности проводят в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

2.2.6. Определение класса по комплексу признаков

Класс кроликов определяют по живой массе, телосложению, густоте и окраске волосяного покрова в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Таблица 6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ

Живая масса, класс	Телосложение, класс	Густота волосяного покрова, класс	Окраска волосяного покрова, класс	Классность
Э	Э	Э	Э	Э
Э	Э	I	Э	I
Э	Э	Э	I	I
Э	Э	I	I	I
Э	I	Э	Э	I
Э	I	I	Э	I
Э	I	I	I	I
I	I	I	I	I
Э	Э	Э	II	I
Э	II	Э	Э	II
Э	II	Э	II	II
Э	Э	II	Э	II
Э	II	II	II	II
II	II	II	II	II
Э	Э	Э	III	II

I	I	I	III	II
Э	III	Э	Э	III
Э	III	Э	III	III
Э	Э	III	Э	III
Э	III	III	III	III
III	III	III	III	III
I	Э	II	III	III

2.3. Оценка кроликов по воспроизводительной способности

2.3.1. Оценка крольчих

Для оценки воспроизводительной способности крольчих учитывают данные о количестве и качестве рожденного и выращенного ею молодняка в каждом окроле и всего за год, о живой массе выращенного к отъему молодняка, а также о том, насколько равномерно из окрола в окрол крольчиха выращивает пометы, одинаковые по количеству и качеству крольчат.

2.3.2. Оценка самцов

Воспроизводительную способность самцов определяют по проценту оплодотворенных крольчих за год.

Оценку кроликов по воспроизводительной способности проводят в соответствии с требованиями, указанными в табл. 7.

Таблица 7

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ КРОЛИКОВ

Класс	Самки			Самцы
	Количество отсаженных крольчат (не менее)			Оплодотворено крольчих за год (% , не менее)
	мясо-шкурковые	мясные	пуховые	
Элита	7	7	6	95
I	6	6	5	85
II	5	5	4	75
III	4	4	3	60

2.4. Оценка кроликов по происхождению

Молодняк, продаваемый на племя в возрасте 2 - 4 мес., оценивают по происхождению (классу родителей) в соответствии с табл. 8.

Таблица 8

ОЦЕНКА МОЛОДНЯКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ

Показатели бонитировки	Молодняк класса элита		Молодняк I класса		Молодняк II класса	
	самцы	самки	самцы	самки	самцы	самки

Класс родителей	Элита	Элита	Один из родителей I класса, другой – класса элита	Один из родителей II класса, другой – класса элита или I
--------------------	-------	-------	---	--

2.5. Для комплектования племенного ядра используются кролики не ниже I класса, для пользовательной части стада - не ниже II класса.

Животные ниже II класса подлежат выбраковке.